

# Bonsaï Ligustrum/Privet

AVERTISSEMENT :

**Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.**

**Politique de vente : Vente Finale / Aucun Remboursement / Ni Échange.**

## Descriptif

Le genre Ligustrum (Troène) comprend environ 50 espèces, originaires d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Australie. Ligustrum sinense (Troène de Chine) est l'une de ces espèces, originaire de Chine. Cet arbuste peut atteindre 5 m de hauteur. Feuillage assez persistant, vert sombre. Feuilles ovales, molles, de 3 à 7 cm de long. Floraison blanche en juin-juillet. Fleurs petites, à odeur fade, en panicules terminales. Fruits noirs, ovales, abondants, persistants en hiver. Utilisé en bonsaï pour la beauté de son feuillage, de sa floraison et de ses fruits. Le Troène demande beaucoup de lumière. Evitez le soleil brulant, privilégiez le soleil du matin ou de la fin d'après-midi. Peut être sorti pendant la saison chaude. Plage de température de 15°C à +35°C. Evitez les courants d'air et les changements brutaux de température. A rentrer tôt à l'automne, dans un local très lumineux à 15°C environ. Arrosez abondamment en laissant le substrat absorber toute l'humidité avant d'arroser à nouveau. Augmentez la fréquence en été et en hiver. Vaporisez en hiver tous les jours autour du feuillage. Rempotage **tous les 2 ans**, au printemps. Veillez à ne pas blesser le pivot des racines. Taille des rameaux fin février en rabattant ceux ci très court. Retaillez ensuite pendant la période de végétation.

Arbuste cultivé en bonsaï Bonsaï d'intérieur, pouvant être sorti à la saison chaude  
Décoratif par son feuillage, sa floraison, ses fruits.

Le Troène demande beaucoup de lumière et beaucoup d'humidité. Peut être sorti pendant la saison chaude. A rentrer tôt à l'automne, dans un local très lumineux à 15°C environ. Arrosez abondamment en laissant le substrat absorber toute l'humidité avant d'arroser à nouveau. Augmentez la fréquence en été et en hiver. Vaporisez en hiver tous les jours autour du feuillage.

Taillez les rameaux fin février en rabattant ceux ci très court. Retaillez ensuite pendant la période de végétation.

## Floraison

- **Mois de floraison:** Mai, Juin; Juillet
- **Forme de la fleur:** Panicule
- **Floraison parfumée:** Oui
- **Description parfum:** Floral
- **Période de floraison:** Fleurs blanches en juin-juillet voir septembre

## Classification

- **Genre:** Ligustrum
- **Origine de l'espèce:** Originnaire de Chine
- **Famille-1:** Oléacées
- **Nom commun:** Troène de Chine
- **Espèce:** Sinense
- **Mode de vie:** Vivace

## Environnement du bonsai

- **Hygrométrie:** Importante
- **Luminosité:** Lumière vive sans soleil direct
- **Exposition:** Soleil;Mi-ombre
- **Commentaire environnement de la plante:** Pas de courants d'air
- **Lieu de vie:** Plante d'intérieur

## Tailles des bonsais

- **Commentaires sur période de taille:** Pendant la période de végétation, retaillez les rameaux lorsqu'ils se sont beaucoup développés.
- **Mois de taille Taille de structuration:** Février; Mars
- **Période de taille Taille de structuration:** De Février à Mars
- 

**Fertiliser** une fois par mois du printemps à l'automne est suffisant type 20-20-20  
Nous suggérons que les engrais soient utilisés **1/2 dose, voir 1/3 de la dose.**

Printemps, été et automne **2 fois mois type 20-20-20,**

Hiver **1 fois mois type 20-20-20**

## Feuillage

- **Type de feuillage:** Persistant
- **Feuillage décoratif:** Oui
- **Commentaires du feuillage:** Feuillage assez persistant, vert sombre, luisant dessus, velu au revers.
- **Couleur du feuillage:** Vert

## Soin et entretien

- **Mois d'apport d'engrais:** Toute l'année au 15 jours
- **Apport engrais:** ½ cuillère à thé pour 1 litre d'eau
- **Périodicité d'arrosage:** Février à septembre 2 fois par semaine; Octobre à janvier 1 fois par semaine
- **Ennemis maladies et remèdes:** Charançons; Chenilles; Frisolée; Mosaïque; Oïdium; Pourridié
- **Commentaire arrosage:** Arrosage abondant sur toute la surface du bonsaï, en laissant sécher le sol absorber toute l'humidité entre deux arrosages. Augmentez la fréquence en été et en hiver; diminuez au printemps et à l'automne. Vaporisez en brumisation tous les jours en hiver.
- **Période de repotage:** Printemps
- **Mois de repotage:** Mars; Avril
- **Fréquence de repotage:** Tous les 2 à 3 ans